

在名古屋報道各社、文部科学記者会、科学記者会

## 導入剤を使わずに肺内で遺伝子発現を抑制 吸入可能な naked siRNA 高含有粉末製剤を開発

特定の遺伝子の発現を抑えることで病気の治療を目指す siRNA 医薬は、現在、臨床応用が肝疾患に限定されており、他の疾患への適応拡大が強く望まれています。特に、肺疾患の治療に向けては、siRNA を肺内に直接送達できる吸入剤の開発が求められています。


名城大学薬学部の奥田 知将 准教授（薬物送達学、製剤学）のグループは、コレステロールを化学修飾した naked siRNA<sup>注1</sup>）を高含有率で配合しつつ、安定性を備えた吸入粉末製剤の開発に成功しました。siRNA の細胞内への送達には、導入剤が広く用いられていますが、その毒性が課題となる場合があります。本研究では、導入剤を用いずに遺伝子発現を抑制できる製剤の開発に取り組み、優れた肺送達性を実現するとともに、肺内で遺伝子発現を抑制できることを明らかにしました。

本成果は、導入剤を用いない naked siRNA の吸入粉末製剤化の実現可能性および有用性を示すものであり、肺疾患治療への応用展開が期待されます。

本研究成果は、2026 年 10 月 5 日に Elsevier B. V.社が出版する国際学術誌「International Journal of Pharmaceutics」に掲載されました。

### 【ポイント】

- ・ **naked siRNA の高含有粉末製剤化に成功**： コレステロール修飾 naked siRNA を 10% または 20% の高含有率で配合し、製剤化後も siRNA の化学構造と遺伝子発現抑制活性を維持
- ・ **優れた肺送達性を実現**： 吸入による肺送達率が約 60% に達し、既存の吸入剤で報告されている 20-50% を上回る性能を確認
- ・ **導入剤を使わずに肺内で遺伝子発現を抑制**： 肺転移モデルマウスへの気管内投与により、肺内の標的遺伝子の発現抑制効果を確認するとともに、今回の評価条件下で明らかな肺障害や炎症を示す変化がないことを確認



&lt; 発信元 &gt; 名城大学渉外部広報課

〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口一丁目 501 番地

TEL:052-838-2006 FAX:052-833-9494 MAIL:koho@ccml.meijo-u.ac.jp

## 【詳細な説明】

### 1. 背景

siRNA (small interfering RNA) は、21–25 塩基対程度の短い二本鎖 RNA であり、RNA 干渉<sup>注2)</sup>を誘導することで、標的遺伝子の発現を強力かつ選択的に抑制します。一方、siRNA は生体内でヌクレアーゼによって速やかに分解されることに加え、負電荷をもつ親水性高分子であるため、その物性により細胞に取り込まれにくいことが、臨床応用上の大きな課題となっています。こうした課題を克服するため、化学修飾や脂質ナノ粒子 (LNP) を応用した siRNA 医薬 (注射剤) が実用化されていますが、現在は肝疾患治療への適用に限定されています。また、LNP などの導入剤<sup>注3)</sup>は、siRNA の細胞内への移行を促進する一方、毒性が高まる点が問題視されています。

siRNA を肺疾患の治療に応用するためには、肺内に siRNA を直接かつ非侵襲的に送達できる「吸入剤」としての製剤開発が有望視されています。なかでも取り扱いや保存が容易で、吸入投与に適した「粉末製剤」の開発が期待されています。しかし、吸入粉末製剤を実現するには、吸入による肺への送達に適した粉体物性を付与するとともに、製剤化後も siRNA の構造・活性を保持できる高度な技術の確立が不可欠です。

これまでに著者らは、噴霧急速凍結乾燥 (SFD) 法<sup>注4)</sup>および噴霧乾燥 (SD) 法<sup>注5)</sup>を用いて、疎水性アミノ酸のロイシン (Leu) を賦形剤とした粉末製剤を調製し、それらが優れた肺送達性を示すことを明らかにしてきました (参考文献 1)。さらに、導入剤を含まない naked siRNA においても物理的ストレスに対して比較的高い安定性を示すこと、また naked siRNA と賦形剤を用いて SFD 法および SD 法により粉末製剤化した際にも、siRNA の構造・活性を保持できることを見出しています (参考文献 2)。

### 2. 研究内容及び本成果の意義

本研究では、賦形剤として Leu を適用した SFD 法および SD 法を基に、高含有率 (10%または 20% (w/w)) の naked siRNA の吸入粉末製剤の開発に取り組みました。また、導入剤を用いずに遺伝子発現抑制効果を発揮することを目指し、siRNA にコレステロールを化学修飾した Chol-siRNA についても同様に粉末製剤化し、無修飾 siRNA を用いた粉末製剤と比較検証しました。

電子顕微鏡で観察したところ、SFD 製剤では内部が空洞で多孔質に富む直径が 10–20  $\mu\text{m}$  の球状微粒子が、SD 製剤では表面が凹凸に富む直径が 1–2  $\mu\text{m}$  の球状微粒子がそれぞれ認められました。これらの粒子構造は、コレステロール修飾の有無および siRNA の含有率にかかわらず、主に製造法および賦形剤によって特徴づけられていました (図 1)。また、電気泳動および培養細胞による評価から、これらの製剤中で siRNA の化学構造および遺伝子発現抑制活性が維持されていることを確認しました。特に Chol-siRNA を含む粉末製剤では、Chol-siRNA の原液と同様に、導入剤を加えずとも遺伝子発現抑制効果を発揮することを明らかにしました。

さらに吸入による肺送達性を評価したところ、Chol-siRNA の含有率が 20%の SFD 製剤および 10%の SD 製剤はいずれも、肺送達率が約 60%であり、実用化されている吸入剤 (肺送達率は 20–50%) よりも優れた肺送達性を有していました。

続いて、ルシフェラーゼを標的とする Chol-siRNA の含有率が 20%の SFD 製剤および 10%の SD 製剤について、ルシフェラーゼを発現するがん細胞の肺転移モデルマウスを用いて、気管内投与による遺伝子発現抑制効果を評価しました。無投与群では、日数経過に伴ってがん細胞の増殖により肺内でルシフ

ェラーゼ量が増加するのに対して、これらの粉末製剤を投与した群では、Chol-siRNA の原液を投与した場合と同様に、ルシフェラーゼ量の増加が抑制されました（図2）。この結果から、Chol-siRNA を含む吸入粉末製剤が、肺内で遺伝子発現抑制効果を発揮することが示されました。

さらに、種々の障害性マーカー（体重・動脈血酸素飽和度・肺重量および気管支肺泡洗浄液中の有核細胞数・乳酸脱水素酵素漏出量・炎症性サイトカイン量）を測定し、製剤投与による影響を評価したところ、いずれの指標も無投与群と同程度であり、今回評価した条件下では、明らかな肺障害や炎症を示す変化は認められませんでした。これらの結果は、本製剤が優れた肺送達性と遺伝子発現抑制効果を示すとともに、一定の安全性を有する可能性を示しています。




図1. 粉末製剤の電子顕微鏡画像  
(A) SFD製剤 (Chol-siRNAを20%含有) (B) SD製剤 (Chol-siRNAを10%含有)




図2. 投与2日後のin vivo発光イメージング画像（ルシフェラーゼ発現を検出）  
(A) 無投与 (B) Chol-siRNA原液  
(C) SFD製剤 (Chol-siRNAを20%含有) (D) SD製剤 (Chol-siRNAを10%含有)

### 3. 今後の展開

これらの研究成果を基に、(株)アルバック、大阪大学、日本医療研究開発機構 (AMED) と協力し、治療用 siRNA を用いた産学官連携による共同研究を進めています。さらなる研究成果の積み重ねにより、肺疾患治療薬としての実用化を目指していきます。

### 【参考文献】

1. Otake H, Okuda T, Okamoto H. Development of Spray-Freeze-Dried Powders for Inhalation with High Inhalation Performance and Antihygroscopic Property. Chem Pharm Bull. 2016;64(3):239–245.

<https://doi.org/10.1248/cpb.c15-00824>

2. Okuda T, Okazaki M, Hayano A, Okamoto H. Stability of Naked Nucleic Acids under Physical Treatment and Powder Formation: Suitability for Development as Dry Powder Formulations for Inhalation. *Pharmaceutics*. 2023;15(12):2786. <https://doi.org/10.3390/pharmaceutics15122786>

### 【用語解説】

#### 注1 naked siRNA

導入剤などの送達担体を用いずに、単独で取り扱う siRNA を指す。本研究では、コレステロールを化学修飾した siRNA (Chol-siRNA) も対象としている。

#### 注2 RNA 干渉

二本鎖 RNA と相補的な塩基配列を有する mRNA が分解あるいは翻訳阻害される遺伝子発現抑制機構のことで、ウイルスに対する感染防御としても機能している。この機構の発見者である Andrew Z. Fire 氏と Craig C. Mello 氏は、2006 年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。siRNA を細胞内に導入することで、人為的に RNA 干渉を誘導することができる。

#### 注3 導入剤

核酸を細胞内へ効率よく送達するために用いられる物質。主に正電荷を有する高分子やナノ粒子が用いられ、負電荷を帯びた核酸との静電的相互作用を介して、複合体の形成やナノ粒子への封入が行われる。これにより、核酸の安定性を高めるとともに、細胞内移行性を増大する。mRNA ワクチンに応用されている LNP も導入剤に該当し、副作用の原因である可能性が指摘されている。

#### 注4 噴霧急速凍結乾燥 (spray freeze drying: SFD) 法

成分溶液を液体窒素中に噴霧することで、液滴を瞬間凍結し、凍結乾燥機内で昇華により溶媒を除去する乾燥技術。凍結した液滴中の溶媒が除去される過程で空洞が形成され、中空多孔性に富む球状の粉末微粒子が得られる。また、凍結した液滴の表面積が大きいこと、従来の凍結乾燥法よりも乾燥時間を短縮できる利点もある。

#### 注5 噴霧乾燥 (spray drying: SD) 法

成分溶液を高温気流中に噴霧することで、蒸発により液滴中の溶媒を除去する乾燥技術。蒸発の進行に伴って液滴のサイズが小さくなるため、極微細な球状の粉末微粒子が得られる。海外では、この技術を基に開発した吸入粉末製剤が実用化に至っている。

### 【掲載論文】

雑誌名: *International Journal of Pharmaceutics*

タイトル: Development of inhalable dry powders with a high content of naked cholesterol-modified siRNA by spray freeze drying and spray drying techniques

(噴霧急速凍結乾燥法および噴霧乾燥法による、吸入可能なコレステロール修飾 naked siRNA 高含有粉末製剤の開発)

著者名：Tomoyuki Okuda, Kotone Oshiro, Mayu Sakakibara, Takashi Murakami, Hirokazu Okamoto  
(奥田知将、大城琴音、榊原茉優、村上 孝、岡本浩一)

掲載日時：2026 年 10 月 5 日

DOI: [10.1016/j.ijpharm.2026.127308](https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2026.127308)

【著者のコメント】

奥田知将 (名城大学 薬学部 准教授)

本研究の成果は、主に指導学生の大城琴音さんが熱心に研究に取り組んだ努力が結実したものです。6 年制の薬学部生として限られた卒業研究期間中に、粉末製剤の作成から物性評価、培養細胞および小動物を用いた作用評価まで幅広く実験に従事してもらい、苦労や喜びを分かち合いながら研究を進めてきました。今後も学生に研究の魅力や面白さを伝えつつ、協同して成果を出していきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

・ 研究内容に関すること

名城大学 薬学部 准教授

奥田 知将 (おくだ ともゆき)

Tel: 052-839-2654

Email: [tokuda@meijo-u.ac.jp](mailto:tokuda@meijo-u.ac.jp)

・ 広報担当

名城大学 渉外部 広報課

Tel: 052-838-2006

Email: [koho@ccml.meijo-u.ac.jp](mailto:koho@ccml.meijo-u.ac.jp)